

MODULO DI CONSENSO INFORMATO

AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANSRETTALE

Definizione - La biopsia prostatica è una procedura indispensabile qualora vi sia un sospetto di patologia prostatica, in seguito al riscontro di un'esplorazione rettale dubbia o di un PSA aumentato.

Descrizione della tecnica - La biopsia viene eseguita in anestesia locale. Durante l'ecografia prostatica transrettale si iniettano in sede periprostatica 10 cc di carbocaina 1%; quindi con un ago idoneo si eseguono da 12 a 24 prelievi della ghiandola prostatica. La manovra può comportare un leggero dolore, anche se effettuata con anestesia locale.

Preparazione alla biopsia - Il Paziente deve segnalare eventuali patologie a carico delle valvole cardiache, eventuali disturbi della coagulazione noti o alterazione dei tempi di sanguinamento riscontrati in corso di precedenti manovre (per es. estrazioni dentarie). È opportuno che sospenda alcuni giorni prima eventuali terapie anticoagulanti e antiaggreganti, secondo indicazione medica. La sera prima o la mattina della manovra è necessario eseguire un clistere di pulizia. Un'ora prima dell'esame va iniziata una profilassi antibiotica da proseguire per 5 giorni. Per prevenire episodi lipotimici (svenimento) durante la biopsia, può essere somministrata una leggera sedazione che determina un rallentamento dei riflessi anche nelle ore successive alla procedura rendendo pericoloso lo svolgimento di attività che richiedono coordinazione e attenzione come per es. la guida di automezzi. È pertanto necessario essere accompagnati.

Risultati - La tecnica ecoguidata consente in genere di ottenere prelievi nelle sedi volute ed in quantità sufficiente a porre la diagnosi. Come tutte le procedure diagnostiche anche la biopsia prostatica è gravata da falsi negativi: cioè la possibilità di non ottenere una diagnosi istologica di tumore anche in presenza dello stesso. Nei casi negativi sarà lo specialista a decidere se e quando ripetere l'esame in base alla situazione clinica.


Complicanze - Dopo la biopsia il Paziente viene tenuto in osservazione per qualche ora. Sono descritti episodi di sincope o lipotimia. Le emorragie sono generalmente lievi e incidono per un 20% circa: si manifestano con presenza di sangue nello sperma e/o nelle urine e/o sanguinamento rettale può essere osservato (in forma lieve) anche per 15 giorni. L'edema della ghiandola prostatica può causare raramente ritenzione acuta di urina con la necessità di posizionamento di catetere vescicale. In alcuni casi possono manifestarsi complicanze infettive: prostatite, orchiepididimite, cistite, cistopielite, sepsi. Nel caso in cui si manifestasse una delle complicanze sopra descritte è opportuno rivolgersi all'urologo.

.....

Il Paziente

Il Medico

Data.....



AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANSRETTALE

NORME DI PREPARAZIONE PER IL PAZIENTE

- La mattina (o la sera prima) della biopsia eseguire una **peretta evacuativa**.
- Il giorno dell'esame è preferibile il digiuno o una colazione leggera.
- Un ora prima dell'esame assumere un **antibiotico**: un fluorochinolone o un betalattamico da proseguire per 5 giorni
- I Pazienti portatori di protesi valvolare cardiaca o affetti da prolasso della valvola mitralica devono eseguire una profilassi antibiotica specifica.
- I Pazienti che assumono **antiaggreganti piastrinici** (Cardioaspirina, Aspirinetta, Ascriptin e analoghi) devono sospendere il trattamento 5 giorni prima della biopsia, sostituendolo eventualmente con Eparina a basso peso molecolare (sotto il controllo del Medico Curante).
- I Pazienti che assumono **Sintrom** o **Coumadin** devono sospendere il trattamento 7 giorni prima sostituendolo con Eparina a basso peso molecolare (sotto il controllo del Medico Curante). Il giorno prima della biopsia è necessario eseguire dosaggio del PT (INR) e portare in visione il referto.
- Altre terapie farmacologiche in atto (per es. farmaci anti-ipertensivi) vanno assunte come d'abitudine
- È opportuno che il Pazienti si presenti all'appuntamento per la biopsia accompagnato da qualcuno. È consigliabile che il Paziente non guidi l'automobile.
- Il giorno dell'esame portare in visione:
 - il dosaggio del **PSA**
 - il modulo di **Consenso informato** completo di data e firma