



**Modulo di informazione per la plastica prepuziale e/o di allungamento del frenulo**

La fimosi è la condizione in cui la pelle del prepuzio non si retrae sotto il glande, per cause congenite o cicatriziali; di solito coesiste anche la brevità del frenulo. L'intervento di plastica prepuziale si esegue in anestesia locale nell'adulto ed in anestesia generale nel bambino. Consiste in una incisione circolare del prepuzio asportandone la parte più stretta e suturandone i bordi; parimenti si seziona il frenulo suturandolo in modo da allungarlo. La complicanza più comune è l'emorragia, risolvibile nel postoperatorio di solito con la semplice compressione; più rara è l'infezione. In qualche caso può insorgere recidivare fimosi causata dall'eccessiva cicatrizzazione. Se è presente solo la brevità del frenulo si pratica solo la frenulotomia.

La dimissione avviene comunque in giornata.

NOTE: .....

.....

.....

**Consenso informato**

Io sottoscritto ....., preso atto di tutte le informazioni, comprese quelle relative a possibili trattamenti diversi da quelli proposti, ritengo di aver ottenuto gli elementi indispensabili per giungere ad una scelta consapevole.

Pertanto, certo comunque che un mio eventuale rifiuto non comporta conseguenze per quanto riguarda la prosecuzione dell'assistenza secondo necessità, acconsento al trattamento proposto.

Poiché sono a conoscenza del fatto che, dinanzi ad impreviste difficoltà, il medico potrebbe giudicare necessario modificare la procedura concordata, autorizzo sin d'ora il cambiamento del programma ma al solo scopo di fronteggiare l'urgenza delle eventuali complicanze, delle quali mi attendo comunque di avere al più presto spiegazioni adeguate.

DATA, ..... Firma del Paziente: .....