

## MODULO DI CONSENSO INFORMATO

### NEFROSTOMIA PERCUTANEA

**DEFINIZIONE** E' una procedura che consiste nella puntura delle cavità renali attraverso la cute della regione lombare, sotto controllo ecografico o fluoroscopico, allo scopo di realizzare una comunicazione stabile tra le cavità renali e la superficie corporea per mezzo di un catetere in materiale soffice da connettere ad un raccogliitore.

**INDICAZIONI** Si ricorre alla nefrostomia percutanea:

- in caso di ostruzione ureterale acuta o cronica determinante insufficienza renale allorchè tale ostruzione non sia superabile con manovre endoscopiche per via retrograda;
- quale tempo preliminare per l'allestimento del tramite per l'esecuzione di manovre endoscopiche sulle alte vie urinarie per via percutanea (frantumazione e/o rimozione di calcoli, rimozione di corpo estraneo, trattamento di neoplasie pielocalicili superficiali e di basso grado, incisione del giunto pielo-ureterale, ecc);
- quale tempo preliminare per manovre sull'uretere per via anterograda (ad esempio: frantumazione e rimozione di calcoli, posizionamento di cateteri o stents ureterali, ecc).

**DESCRIZIONE DELLA TECNICA** La tecnica di posizionamento è più o meno semplice a seconda che il rene sia molto o poco ostruito e quindi più o meno dilatato. Sotto guida ecografica si individua il rene, si anestetizza la cute del fianco sotto le coste, si punge il fianco con un ago e su questo si fa scorrere un tubicino molle che, una volta raggiunto il rene, drena subito l'urina verso l'esterno. Vi sono due tipi di drenaggi: a ricciolo e a palloncino. Il primo è meno ancorato al corpo e tende a fuoriuscire se viene lasciato a lungo; il secondo è invece più stabile e fisso grazie ad un palloncino interno che gonfiato fa da ancoraggio. I materiali di costruzione sono numerosi e diversi fra loro ma assicurano tutti un buon funzionamento per alcune settimane o mesi.

**PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO** La procedura richiede solamente l'anestesia locale; non è quindi richiesta alcuna preparazione all'intervento.

**DURATA DELLA PROCEDURA** Da 15 a 30 minuti, in relazione alla entità della dilatazione delle cavità renali.

**TIPO E DURATA DEL RICOVERO** La procedura viene attuata nel corso di un ricovero ordinario per la necessità di monitorare la funzionalità renale per qualche giorno dopo la nefrostomia o perché fa parte di una procedura chirurgica più complessa. In alcune indicazioni è comunque possibile attuare la procedura in Day Surgery, con poche ore di permanenza in ospedale, specialmente quando si tratta di riposizionare il catetere nefrostomico dopo una fuoriuscita accidentale dello stesso con chiusura del tramite.

**RISULTATI** La nefrostomia percutanea ha un tasso di successo vicino al 100% quando le cavità renali sono dilatate; se manca la dilatazione il successo è fra il 70 e l'80%. Quando viene attuata allo scopo di drenare un rene particolarmente disteso e dolente comporta la scomparsa della sintomatologia dolorosa nel giro di pochi minuti. In caso di infezione concomitante con febbre, il drenaggio delle cavità renali dilatate, coadiuvata dalla terapia antibiotica, comporta in genere la rapida risoluzione della fase acuta febbrile.

**VANTAGGI** Accesso rapido al rene senza necessità di manovre endoscopiche che possono essere all'origine di complicanze.

**SVANTAGGI** La permanenza del catetere nefrostomico, con la necessità di portare il sacchetto raccogliitore per l'urina che continuamente viene prodotta dal rene, richiede una cura particolare del tramite da cui esce il catetere, soprattutto nel caso di nefrostomia definitiva. Nel caso di utilizzo di sacchetti raccoglitori adesivi, possono determinarsi dermatiti reattive da intolleranza cutanea all'adesivo.

**EFFETTI COLLATERALI** La modificazione dello schema corporeo, rappresentato dal catetere nefrostomico, può determinare problemi psicologici nei soggetti predisposti.

**COMPLICANZE** Possono essere legate alla puntura del rene o alla permanenza del catetere nefrostomico. Quelle legate alla puntura renale sono riconducibili a possibili ematomi perirenali (2-3%), perforazione intestinale (1,5%), stravasamento di urina attorno al rene (0.5%).

Quelle legate alla permanenza del catetere sono: l'ostruzione e lo spostamento del catetere nefrostomico, che richiedono entrambe la sostituzione con una nuova nefrostomia se non è possibile recuperare il tramite. Un'altra complicanza rara è l'allergia all'anestetico locale, che si verifica pochi minuti dopo iniezione della sostanza anestetica, e può essere di varia intensità: l'ospedale è attrezzato per curare immediatamente questa complicanza.

**ATTENZIONI DA PORRE ALLA DIMISSIONE** Il paziente deve essere istruito per avere cura del catetere nefrostomico. In caso di infezione urinaria è indicata la terapia antibiotica eventualmente a cicli. Nella nefrostomia definitiva va programmata la sostituzione periodica del catetere nefrostomico.




**STRUTTURA COMPLESSA UNITÀ OPERATIVA DI UROLOGIA**

UNITÀ OPERATIVA DI UROLOGIA OSPEDALE DI DOLO  
Servizio ambulatoriale di Urologia Ospedale di Mirano  
Servizio ambulatoriale di Urologia Ospedale di Noale



**COME COMPORTARSI IN CASO DI COMPLICANZE INSORTE DOPO LA DIMISSIONE** E' consigliabile fare riferimento al centro ove è stata effettuata la procedura.

**CONTROLLI** Nella nefrostomia transitoria il catetere viene rimosso dopo un periodo stabilito caso per caso. Nella nefrostomia definitiva va programmata la sostituzione periodica del catetere nefrostomico e la cadenza dei controlli della funzionalità renale oltre che della malattia di base che ha reso necessaria la nefrostomia.



**Consenso informato**

Io sottoscritto ....., preso atto di tutte le informazioni, comprese quelle relative a possibili trattamenti diversi da quelli proposti, ritengo di aver ottenuto gli elementi indispensabili per giungere ad una scelta consapevole.

Pertanto, certo comunque che un mio eventuale rifiuto non comporta conseguenze per quanto riguarda la prosecuzione dell'assistenza secondo necessità, acconsento al trattamento proposto.

Poiché sono a conoscenza del fatto che, dinanzi ad impreviste difficoltà, il medico potrebbe giudicare necessario modificare la procedura concordata, autorizzo sin d'ora il cambiamento del programma ma al solo scopo di fronteggiare l'urgenza delle eventuali complicanze, delle quali mi attendo comunque di avere al più presto spiegazioni adeguate.

DATA, .....

Firma del Paziente: .....