



Modulo di informazione per la terapia iniettiva periuretrale

La terapia iniettiva periuretrale viene eseguita in anestesia locale. La comparsa di urgenza minzionale è riportata nel 12,6% dei casi, una lieve e transitoria ematuria nei 5% delle pazienti e un breve periodo di ritenzione urinaria nell'1,9% dei casi. Possibile complicanza è il riassorbimento o la migrazione del materiale iniettato.

NOTE:.....
.....
.....

Consenso informato

Io sottoscritto, preso atto di tutte le informazioni, comprese quelle relative a possibili trattamenti diversi da quelli proposti, ritengo di aver ottenuto gli elementi indispensabili per giungere ad una scelta consapevole.

Pertanto, certo comunque che un mio eventuale rifiuto non comporta conseguenze per quanto riguarda la prosecuzione dell'assistenza secondo necessità, acconsento al trattamento proposto.

Poiché sono a conoscenza del fatto che, dinanzi ad impreviste difficoltà, il medico potrebbe giudicare necessario modificare la procedura concordata, autorizzo sin d'ora il cambiamento del programma ma al solo scopo di fronteggiare l'urgenza delle eventuali complicanze, delle quali mi attendo comunque di avere al più presto spiegazioni adeguate.

DATA, Firma del Paziente: